

Рентгенография почек (экскреторная урография)

Для проведения исследования необходимо:

- отсутствие аллергической реакции на йодсодержащий препарат;
 - биохимический анализ крови (уровень мочевины, креатинина)
- срок – не позднее 14 дней, за 3 дня до процедуры;
- при сахарном диабете необходима предварительная консультация врача эндокринолога;
 - при приеме **МЕТФОРМИНА** необходима предварительная консультация уролога, нефролога или терапевта;
 - в случае если требуется провести исследование мочевого пузыря, в направлении необходимо сделать пометку «цистография».

Для улучшения информативности исследования требуется тщательная подготовка:

- За 2-4 дня до исследования исключить из рациона пищу богатую клетчаткой и способствующую брожению: черный хлеб, картофель, бобовые (горох, нут), гречка, капуста, яблоки, сладкие блюда, овощные салаты, компоты, соки, молочные продукты и другие продукты, которые индивидуально плохо переносятся пациентом и способствуют процессу газообразования.
- При сильных запорах – очистительная клизма или слабительные препараты.
- За сутки до исследования: 19:00 легкий ужин. Через 2 часа после ужина для уменьшения газообразования следует добавить 10-15 мл симетикона. Препараты симетикона следует выбирать в форме капель, приём капсул и таблеток запрещен.
- Приезжать натощак, не пить, не курить, жевательную резинку не жевать.
- Непосредственно перед исследованием опорожнить мочевой пузырь.